

اسم المراجع	اسم المصحح	الدرجة المستحقة		رقم السؤال
		رقماً	كتابةً	
				الأول
				الثاني
				الثالث
				الرابع
				الخامس
				السادس
				المجموع

 وزارة التعليم Ministry of Education		المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة مدارس الخندق الأهلية ابتدائي * متوسط * ثانوي	
<b>أسئلة اختبار</b> الفصل الدراسي الثاني نظام المقررات للعام الدراسي: ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ			
اسم الطالب:		الصف: الثالث الثانوي	
رقم الجلوس:		المادة: كيمياء ٤	
اليوم والتاريخ	الأحد: ١٦/٨/١٤٤٠ هـ	الزمن: ثلاث ساعات	
الدرجة الكلية	رقماً	كتابة	٤٠

ولدي الطالب وفقك الله استعن بالله ثم ابدأ الإجابة

**السؤال الأول:** ظلل الإختيار الصحيح في ورقة الإجابة الخارجية لكل فقرة مما يلي:

- ١- عدد تأكسد الكروم في  $K_2CrO_4$  يساوي.....
 

أ	- 6	ب	+12	ج	+6	د	+4
---	-----	---	-----	---	----	---	----
- ٢- يعد المحلول الذي له قيمة  $pH = 1 \times 10^{-13}$  .....
 

أ	حمض قوي	ب	حمض ضعيف	ج	قاعدة قوية	د	قاعدة ضعيفة
---	---------	---	----------	---	------------	---	-------------
- ٣- في خلية الخارصين والكربون الكاثود هو .....
 

أ	العجينة	ب	الخارصين	ج	KOH	د	عمود الكربون
---	---------	---	----------	---	-----	---	--------------
- ٤- أي المحاليل التالية لا تعد أزواج حمض وقاعدة مرافقة؟
 

أ	$H_2SO_4 / HSO_4^-$	ب	$H_2SO_3 / SO_3^{2-}$	ج	$NH_4^+ / NH_3$	د	$HBr / Br^-$
---	---------------------	---	-----------------------	---	-----------------	---	--------------
- ٥- نسبة عدد مولات المذاب أو المذيب إلى عدد المولات الكلية في المحلول.....
 

أ	الكسر المولي	ب	النسبة المئوية بالكتلة	ج	المولارية	د	المولالية
---	--------------	---	------------------------	---	-----------	---	-----------
- ٦- ينتج عن إضافة قاعدة ضعيفة إلى حمضها المرافق.....
 

أ	المحلول القياسي	ب	المحلول المخفف	ج	المحلول المنظم	د	المحلول المشبع
---	-----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------
- ٧- لو وزن النقص في الهيدروجين ( في الوسط القاعدي ) في معادلات الأكسدة والاختزال.....
 

أ	تضاف $H_2O$	ب	تضاف إلكترونات	ج	تضاف $H_2O$ و $OH^-$	د	تضاف $H^+$
---	-------------	---	----------------	---	----------------------	---	------------
- ٨- بروتين بنائي يعد جزءاً من الجلد والأوتار.....
 

أ	كيراتين	ب	كولاجين	ج	أنسولين	د	هيموجلوبين
---	---------	---	---------	---	---------	---	------------
- ٩- عند ثبوت درجة الحرارة ثم مضاعفة الضغط على غاز معين فإن حجم الغاز.....
 

أ	يظل ثابتاً	ب	يتضاعف	ج	يقبل للنصف	د	يقبل للربع
---	------------	---	--------	---	------------	---	------------
- ١٠- يعد الدم من .....
 

أ	المخاليط المعلقة	ب	المخاليط المتجانسة	ج	المحاليل	د	المخاليط الغروية
---	------------------	---	--------------------	---	----------	---	------------------

انتقل إلى الصفحة التالية لإكمال الحل

١١- كل المواد التالية يكون لها ذوبان طارد للحرارة ما عدا.....

أ	CaCl <sub>2</sub>	ب	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	ج	KOH	د	NaOH
---	-------------------	---	---------------------------------	---	-----	---	------

١٢- في المعادلة التالية :  $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$   
كم لتراً من غاز الأوكسجين يلزم لحرق 2.36 L من غاز الميثان CH<sub>4</sub> ؟

أ	22.4 L	ب	2.36 L	ج	1.18 L	د	4.72 L
---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

١٣- القاعدة النيتروجينية التي لا توجد في DNA وتوجد في RNA هي.....

أ	يوراسيل	ب	سيتوسين	ج	جوانين	د	ثايمين
---	---------	---	---------	---	--------	---	--------

١٤- أيون هيدروجين H<sup>+</sup> مرتبط مع الماء برابطة تساهمية.....

أ	H <sub>3</sub> O <sup>+</sup>	ب	H <sub>3</sub> O <sup>-</sup>	ج	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	د	OH <sup>-</sup>
---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------

١٥- الحمض الأميني يحتوي على مجموعتين وظيفيتين هما.....

أ	كربونيل و كربوكسيل	ب	أمين و كربوكسيل	ج	أمين و كربونيل	د	أمين و هيدروكسيل
---	--------------------	---	-----------------	---	----------------	---	------------------

١٦- الجهد الكهربائي الناتج من الخلية الممثلة بالتفاعل التالي :  $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$  :  
(جهود الإختزال : Zn = - 0.76 V ، Cu = 0.34 V )

أ	0.42V	ب	1.1 V	ج	-1.1V	د	- 0.42 V
---	-------	---	-------	---	-------	---	----------

١٧- محلول تركيز أيون الهيدروجين [H<sup>+</sup>] فيه  $1 \times 10^{-11} M$  . أي من الآتي لا ينطبق على المحلول ؟

أ	pOH = 3	ب	[OH <sup>-</sup> ] = $1 \times 10^{-3} M$	ج	pH=11	د	المحلول حمضي
---	---------	---	---	---	-------	---	--------------

١٨- عدد تأكسد الهيدروجين في NaH = .....

أ	-1	ب	-2	ج	0	د	+2
---	----	---	----	---	---	---	----

١٩- المادة المستخدمة في استمطار الغيوم هي.....

أ	AgBr	ب	NaCl	ج	AgI	د	KI
---	------	---	------	---	-----	---	----

٢٠- تنتقل الأيونات الموجبة والسالبة في الخلية الجلفانية عبر.....

أ	المصعد	ب	المهبط	ج	السلك	د	القطرة الملحية
---	--------	---	--------	---	-------	---	----------------

٢١- أي من المواد الآتية تزداد ذائبته بزيادة الضغط في المحلول ؟

أ	KCl	ب	CO <sub>2</sub>	ج	KClO <sub>3</sub>	د	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub>
---	-----	---	-----------------	---	-------------------	---	---

٢٢- تستعمل خلايا التحليل الكهربائي في كل العمليات التالية ما عدا.....

أ	تنقية المعادن	ب	الطلاء	ج	إنتاج الألمونيوم	د	البطاريات
---	---------------	---	--------	---	------------------	---	-----------

٢٣- المحلول الذي يحتوي على كمية مذاب أكبر مما في المحلول المشبع عند درجة الحرارة نفسها هو المحلول.....

أ	القياسي	ب	المخفف	ج	غير المشبع	د	فوق المشبع
---	---------	---	--------	---	------------	---	------------

٢٤- حركة عشوائية وعنيفة تحدث في المخاليط الغروية.....

أ	البروانية	ب	الإهتزازية	ج	الغروية	د	الدورانية
---	-----------	---	------------	---	---------	---	-----------

٢٥- كلما نقصت قيمة ثابت تآين الحمض K<sub>a</sub> دل ذلك على أن.....

أ	الحمض جيد التوصيل	ب	الحمض تام التآين	ج	الحمض أضعف	د	الحمض أقوى
---	-------------------	---	------------------	---	------------	---	------------

٢٦- تعتبر النشا من.....

أ	السكريات الأحادية	ب	السكريات الثنائية	ج	السكريات العديدة	د	البروتينات
---	-------------------	---	-------------------	---	------------------	---	------------

انتقل إلى الصفحة التالية لإكمال الحل

٢٧- أي من المواد التالية له الأثر الأكبر في انخفاض الضغط البخاري لمحلولها ؟

أ	1m KBr	ب	1m C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	ج	1m CaSO <sub>4</sub>	د	1m MgCl <sub>2</sub>
---	--------	---	--	---	----------------------	---	----------------------

٢٨- ليس من مكونات الخلية الجلفانية .....

أ	أنود	ب	كاثود	ج	طاقة كهربائية	د	إلكتروليت
---	------	---	-------	---	---------------	---	-----------

٢٩- يعد العنصر عامل مؤكسد قوي إذا.....

أ	وصل للتركيب الثماني	ب	كانت كهروساليبته عالية	ج	كانت طاقة تأينه منخفضة	د	كانت درجة غليانه مرتفعة
---	---------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	-------------------------

٣٠- في التفاعل :  $2Al + 3Sn^{2+} \longrightarrow 2Al^{3+} + 3Sn$  القطب الذي تحدث له أكسدة .....

أ	Al	ب	Sn	ج	Sn <sup>2+</sup>	د	Al <sup>3+</sup>
---	----	---	----	---	------------------	---	------------------

٣١- أي الغازات التالية تبتعد عن سلوك الغاز المثالي ؟

أ	H <sub>2</sub>	ب	He	ج	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	د	Ne
---	----------------	---	----	---	--------------------------------	---	----

٣٢- تتفاعل الأحماض مع القواعد وينتج.....

أ	أكسجين	ب	هيدروجين	ج	ثاني أكسيد الكربون	د	ملح + ماء
---	--------	---	----------	---	--------------------	---	-----------

٣٣- عند التحليل الكهربائي لماء البحر يتكون عند الأنود .....

أ	Cl <sub>2</sub>	ب	H <sub>2</sub>	ج	Na	د	NaOH
---	-----------------	---	----------------	---	----	---	------

٣٤- يسمى تفاعل الجليسيريد الثلاثي مع محلول مائي لقاعدة قوية لتكوين أملاح الكربوكسيل والجلسرول .....

أ	التصبن	ب	التكاثف	ج	الحذف	د	التعادل
---	--------	---	---------	---	-------	---	---------

٣٥- تسمى عملية تغليف الحديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد .....

أ	صدأ	ب	ترسب	ج	تآكل	د	جلفنة
---	-----	---	------	---	------	---	-------

٣٦- عند تخفيف المحاليل فإن عدد مولات المذاب .....

أ	يزداد للضعف	ب	يقل للنصف	ج	لا يتغير	د	يقل للربع
---	-------------	---	-----------	---	----------	---	-----------

٣٧- أي الأملاح التالية لا يحدث له تميّه ؟

أ	KF	ب	NH <sub>4</sub> Cl	ج	NaCl	د	CH <sub>3</sub> COONa
---	----	---	--------------------	---	------	---	-----------------------

٣٨- إذا انخفضت درجة الحرارة لعينة من غاز حجمها 300 ml من 300 K إلى 150 K فما حجم الغاز الجديد ؟

أ	133 ml	ب	150 ml	ج	266 ml	د	600 ml
---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

٣٩- يمثل التفاعل :  $MnO_2 + 2H_2O + 2e^- \longrightarrow Mn(OH)_2 + 2OH^-$  تفاعل الكاثود في.....

أ	الخلية الجافة	ب	البطارية القلوية	ج	بطارية السيارة	د	بطارية الفضة
---	---------------	---	------------------	---	----------------	---	--------------

٤٠- أصباغ كيميائية تتأثر ألوانها بالمحاليل الحمضية والقاعدية .....

أ	أملاح	ب	كواشف	ج	أحماض	د	محاليل منظمة
---	-------	---	-------	---	-------	---	--------------

٤١- كتلة كربونات الكالسيوم CaCO<sub>3</sub> اللازمة لتحضير لتر من محلول مائي تركيزه 1.5M منه تساوي.....

( الكتلة المولية لكربونات الكالسيوم 100 g/mol )

أ	150 g	ب	1.5 g	ج	10 g	د	100 g
---	-------	---	-------	---	------	---	-------

٤٢- المادة الصلبة التي تقل ذائبيتها بزيادة درجة الحرارة هي.....

أ	كبريتات سيريوم	ب	كلوريد كالسيوم	ج	كلوريد بوتاسيوم	د	كلوريد صوديوم
---	----------------	---	----------------	---	-----------------	---	---------------

٤٣- أي من الأحماض الآتية يعتبر حمض ضعيف ؟

أ	HCl	ب	HNO <sub>3</sub>	ج	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	د	CH <sub>3</sub> COOH
---	-----	---	------------------	---	--------------------------------	---	----------------------

انتقل إلى الصفحة التالية لإكمال الحل

٤٤- ينشأ التيار الكهربائي من خلال التفاعل الكيميائي في.....

أ	عملية مقاومة المعادن للتآكل	ب	الخلايا الجلفانية	ج	خلايا التحليل الكهربائي	د	عمليات الطلاء
---	-----------------------------	---	-------------------	---	-------------------------	---	---------------

٤٥- ينص قانون ..... على أن ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارته بالكلفن عند ثبوت الحجم.

أ	بويل	ب	جاي - لوساك	ج	شارل	د	أفوجادرو
---	------	---	-------------	---	------	---	----------

٤٦- ينتج من التفاعل التالي : .....

أ	سكروز	ب	مالتوز	ج	لاكتوز	د	سيليلوز
---	-------	---	--------	---	--------	---	---------

٤٧- عدد أكسدة ذرة النيون  $^{10}\text{Ne}$  .....

أ	+8	ب	+6	ج	0	د	+10
---	----	---	----	---	---	---	-----

٤٨- أي الجزيئات التالية تعد أحماضاً حسب نظرية لويس؟

(الأعداد الذرية :  $\text{O} = 8, \text{P} = 15, \text{C} = 6, \text{N} = 7$ )

أ	$\text{NH}_3$	ب	$\text{PCl}_3$	ج	$\text{H}_2\text{O}$	د	$\text{CO}_2$
---	---------------	---	----------------	---	----------------------	---	---------------

٤٩- ذائبية غاز عند  $10 \text{ atm}$  هي  $0.66 \text{ g/L}$ . ما مقدار الضغط الواقع على محلول حجمه  $1 \text{ L}$  ويحتوي على  $0.33 \text{ g}$  من الغاز نفسه؟

أ	$5 \text{ atm}$	ب	$10 \text{ atm}$	ج	$1 \text{ atm}$	د	$20 \text{ atm}$
---	-----------------	---	------------------	---	-----------------	---	------------------

٥٠- الرابطة التي تتكون بين الأحماض الأمينية رابطة .....

أ	إيثرية	ب	أيونية	ج	تناسقية	د	ببتيدية
---	--------	---	--------	---	---------	---	---------

السؤال الثاني: ظلل الإختيار ( صح ) عندما تكون الإجابة صحيحة وظلل الإختيار ( خطأ ) عندما تكون الإجابة خاطئة:


م	العبرة	صح	خطأ
٥١	حجم المول الواحد من الغاز عند الظروف المعيارية STP يعادل $22.4 \text{ L}$ .		
٥٢	يصنف حمض الفورميك $\text{HCOOH}$ من الأحماض عديدة البروتون.		
٥٣	تعد المشروبات الغازية مثلاً على المحاليل الغازية.		
٥٤	$\text{Hg} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Hg}^{2+} + \text{Fe}$ (جهود الاختزال : $\text{Fe} = -0.447 \text{ V}$ , $\text{Hg} = 0.851 \text{ V}$ ) *التفاعل أعلاه يحدث بصورة غير تلقائية.		
٥٥	يمكن فصل مكونات المخروط المعلق بالترويق أو بالترشيح.		
٥٦	الأحماض الدهنية التي تحتوي روابط ثنائية تسمى أحماض دهنية غير مشبعة.		
٥٧	تحديد الغازات عن سلوك الغاز المثالي عند درجات حرارة عالية وضغط منخفض.		
٥٨	إذا حدثت عملية أكسدة لعنصر ما فإن عدد التأكسد له يقل.		
٥٩	الاسم العلمي لسكر اللاكتوز هو سكر الحليب.		
٦٠	النسبة المئوية بالحجم هي النسبة بين حجم المذاب إلى حجم المذيب معبراً عنها بنسبة مئوية.		

انتقل إلى الصفحة التالية لإكمال الحل

السؤال الثالث أ- علل لما يأتي:

١- يفضل عدم نقل اسطوانات الغاز وقت الزوال .

٢- لا تعد كربونات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  قاعدة تبعاً لنظرية أرهينيوس .

٣- عدد أكسدة الأوكسجين مع الفلور موجب .


٤- تعد بطارية السيارة من البطاريات الثانوية .

ب- حدد العامل المؤكسد و العامل المختزل في تفاعل الأكسدة والاختزال التالي:

العامل المختزل	العامل المؤكسد	التفاعل
		$\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{S} + 2\text{HCl}$

ج- احسب النسبة المئوية بالكتلة لمحلول يحتوي على 20 g من كلوريد البوتاسيوم مذابة في 600 mL ماء .

د- اكتب الحمض المرافق للقواعد التالية :




انتقل إلى الصفحة التالية لإكمال الحل

السؤال الرابع : أ- احسب عدد مولات غاز الأمونيا في وعاء حجمه 3L عند ضغط 1.5 atm ودرجة حرارة 300 K ( ثابت الغاز R = 0.0821 L.atm / mol .K )

ب- أكتب وحدة البناء الرئيسية لكل من المبلمرات الحيوية الآتية :

الليبيدات	السيليلوز	الأحماض النووية

ج- اكتب رمز الخلية الجلفانية التي يمثلها التفاعل التالي:



د- أكمل الجدول التالي:

pH	pOH	[OH <sup>-</sup> ]	[H <sup>+</sup> ]
	9		

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق